Lieber Patient, liebe Patientin

Bei Ihnen ist eine Blutentnahme zur Bestimmung der Metanephrine vorgesehen. Um eine Verfälschung der Laborwerte zu vermeiden, bitten wir Sie, u.g. Punkte zu beachten. Bitte planen Sie genügend Zeit für die Blutentnahme ein, da Sie bei diesen Werten vor der Blutentnahme eine halbe Stunde ruhig liegen sollten.

Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten dürfen Sie sich gerne jederzeit bei uns melden.

Metanephrine & Katecholamine im Blut

Patientenvorbereitung:

- Kommen Sie am Tag der Blutentnahme nüchtern, d.h. **nicht essen, trinken und rauchen ab Mitternacht**
- Vor der Blutentnahme müssen Sie bei uns im Ambulatorium **30 Min.** ruhig liegen
- Bringen Sie ihre Medikamente mit. Diese können Sie gerne **nach der Blutentnahme** einnehmen.
- 48 Stunden vor der Blutentnahme dürfen Sie kein Paracetamol (Dafalgan) und keine Alpha- oder Betablocker einnehmen
- Folgende Medikamente müssen 2 Wochen vor der Blutentnahme abgesetzt werden:
  (wird mit dem Arzt besprochen) : Clonidin (Catapresan)
  Trizyklische Antidepressiva

Freundliche Grüsse,
Ihr Team des Medizinischen Ambulatoriums

Lieber Patient, liebe Patientin

Bei Ihnen ist ein 24-Stunden-Sammelurin zur Bestimmung der Metanephrine vorgesehen. Um eine Verfälschung der Laborwerte zu vermeiden, und eine bestmögliche Aussagekraft der Urinsammlung zu ermöglichen, bitten wir Sie, u.g. Punkte zu beachten.

Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten dürfen Sie sich gerne jederzeit bei uns melden.

Metanephrine & Katecholamine im 24-Stunden Urin

- Verzichten Sie während der Urinsammlung auf:
  Kaffee, Tee, Cola, Nikotin, Schokolade und Bananen – diese verfälschen die Messwerte.

- Starten Sie mit der Urinsammlung am Morgen mit dem **2. Morgenurin.** D.h. der erste Morgenurin wird nicht mitgesammelt und geht regulär ins WC. Notieren Sie sich die Uhrzeit, wann Sie angefangen haben zu sammeln**.** Von diesem Moment an **jede Portion Urin** im mitgegebenen Behälter sammeln, 24 Stunden lang, auch nachts.
  Der 1. Morgenurin des nächsten Tages wird noch gesammelt, danach ist Abschluss der Sammlung. Dies sollte möglichst zur gleichen Uhrzeit wie am Vortag, zur Beginn der Sammlung, sein.

- 48 Stunden vor der Urinsammlung dürfen Sie kein Paracetamol und keine Alpha- und Betablocker einnehmen

- Folgende Medikamente müssen 2 Wochen vor der Urinsammlung abgesetzt werden:
  (wird mit dem Arzt besprochen) : Clonidin (Catapresan)
  Trizyklische Antidepressiva

Freundliche Grüsse,
Ihr Team des Medizinischen Ambulatoriums