

Chère patiente, cher patient

Une prise de sang est prévue pour déterminer le taux de métanéphrines. Afin d'éviter de fausser les résultats du laboratoire, nous vous prions de respecter les points mentionnés ci-dessous. Veuillez prévoir suffisamment de temps pour la prise de sang, car avec ces valeurs, vous devez rester au calme pendant une demi-heure avant la prise de sang.

Si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à nous contacter.

Métanéphrines & Catécholamines dans la sang

Préparation du patient:

- Venez le jour de la prise de sang à jeûn, c'est à dire **ne pas manger, boire ni fumer depuis minuit**
- Vous devez rester allongé/e durant **30 minutes** environ avant la prise de sang.
- Apportez vos médicaments avec vous. Vous pourrez les prendre **après le contrôle sanguin**.
- 48 heures avant la prise de sang, vous ne devez pas prendre de paracétamol, d'alpha ou bêtabloqueur.
- Les médicaments suivants doivent être stoppés deux semaines avant la prise de sang: (cela sera discuté avec le médecin.) : Clonidine (Catapresan)
Antidépresseurs tricycliques

Avec nos meilleures salutations
L'équipe de l'unité ambulatoire

Chère patiente, cher patient

Une mesure du taux de métanéphrines dans une collection d'urine de 24h est prévue. Afin d'éviter de fausser les résultats du laboratoire et de permettre la meilleure interprétation possible de la collecte d'urine, nous vous prions de respecter les points suivants.

Si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à nous contacter.

Métanéphrines & Catécholamines

- Renoncez aux boissons suivantes durant la collecte d'urine :
Café, thé, coca, nicotine, chocolat et bananes - ils faussent les valeurs mesurées.
- Commencez la collecte d'urine le matin avec la deuxième urine du matin. C'est-à-dire que la première urine du matin n'est pas collectée et va directement dans les toilettes. Notez l'heure à laquelle vous avez commencé à collecter. A partir de ce moment, collectez chaque urine dans le récipient fourni, pendant 24 heures, même la nuit.
La première urine du matin du jour suivant est encore collectée, puis la collecte est terminée. Dans la mesure du possible, cela devrait se faire à la même heure que la veille, au début de la collecte, c'est-à-dire lorsque la première urine est faite aux toilettes.
- 48 heures avant la collecte d'urine, vous ne devez pas prendre de paracétamol ni d'alpha- ou de bêta-bloquants.
- Les médicaments suivants doivent être arrêtés 2 semaines avant la collecte d'urine :
(à discuter avec le médecin): Clonidine (Catapresan)
Antidépresseurs tricycliques

Avec nos meilleures salutations
L'équipe de l'unité ambulatoire