

Information der Spitalpharmazie USB 2008:

Dipeptiven Infusionskonzentrat 100 ml für die parenterale Ernährung bei KMT- Patienten

Anwendung

Dipeptiven ist ein Infusionskonzentrat, das nicht direkt verabreicht werden darf, sondern vor der Applikation einer kompatiblen Aminosäurelösung oder auch einem aminosäurehaltigen Infusionsregime zugegeben werden muss. Dipeptiven wird zusammen mit der Trägerlösung infundiert. Gemäss Kompendium soll 1 Volumenteil Dipeptiven mit mindestens 5 Volumenteilen Trägerlösung gemischt werden.

Gemäss Arzneimittelkompendium kann Dipeptiven allen gebräuchlichen Nährlösungen zugesetzt werden.

Indikation

Dipeptiven wird angewendet im Rahmen einer parenteralen Ernährung als Zusatz zu Aminosäurelösungen zur Verbesserung der Stickstoffbilanz bei hyperkatabolen Stoffwechsellagen nach operativen Eingriffen.

Dosierung

Dipeptiven wird, nach Körpergewicht dosiert, zu „All in One“-Beuteln Nutriflex Lipid Spezial (1875 ml) zugegeben. Die empfohlene Glutamindosis beträgt 0.5 g/kg. Gemäss Kompendium beträgt die maximale Dauer der Anwendung 5 Tage.

Dosierung:	< 55 kg	100 ml Dipeptiven
(Schema Isolierstation)	55-75 kg	200 ml Dipeptiven
	75-95 kg	300 ml Dipeptiven
	> 95 kg	400 ml Dipeptiven

Die Überleitung erfolgt mit Hilfe des Nutriflex-Transfer Sets.